

## CERAMBYCIDAE UIT CANTABRIA.

---

R. Martinez-Porres en J. de Diego Barquin publiceren in Lambillionea een lijst van tot nu toe aldaar niet bekende Cerambycidae. In de hoop onze leden van dienst te zijn met deze lijst als zij in Cantabria Cerambycidae verzamelen hebben wij ook eventueel de synoniemen vermeld die voor dezelfde soorten soms gebruikt worden.

- *Arhopalus fesus* MULSANT 1839. 12-24mm (syn. *Criocephalus fesus* MULSANT = *Criocephalus tristis* FABR. 1787 ? = *Criocephalus fesus* KRAATZ ? = *Criocephalus polonicus* MOTSCH.). In *Pinus pinaster*, alep den (Picard).
- *Oxypleurus nodieri* MULSANT 1839. 12-15mm. In *Pinus insignis* (Porris), in Fr. in *Pinus caricio* (*P. salzmanni*, *Pinus pinaster* en *Pinus alep* (Picard)
- *Poracantha recurva* NEWMAN 1840. Zeer zeldzaam.
- *Gracilia minuta* FABRICIUS 1781. 6mm. Uit *Prunus spinosa* gekweekt, larven in houtgewas uit de familie *Rosaceae* maar ook in allerhande loofbomen (eik, notelaar, esdoorn).
- *Trichoferus fasciculatus* FALDERMANN 1837. 9-18mm. (= *Callidium griseus* FABR. 1792 = *Hesperophonus faserularis* FALDERMANN). In *Ficus*, *quercus*, *Ilex*, *Acer*, *Eucalyptus* enz. Zeer polyfaag, vooral N. Afrikaanse verspreiding.
- *Purpuricenus kaehleri* LINNAEUS 1758. 9-12mm. Tot 900m in *Quercus*, *Castanea*, *Robinia*, *Salix*, *Gleditschia*.
- *Callimellum abdominale* OLIVIER 1795. 9-12mm. (= *Callimus abdominalis* OLIVIER 1795) Imago op *Sorbus* en *Cratagus*, larve in *Acer campistre*. Meridionaal en zeldzaam.
- *Callimellum angulatum* SCHRANK 1789. 9-10mm. (= *Callimus angulatus* SCHRANK = *Cal. cyaneus*). Imagos op eik (*Quercus* sp.), hazelnoot, meidoorn en schermbloemen. Larve in beuk, eik, ilex. Montaan tot 1000m. Ook in N. Afrika.
- *Phymatodes testaceus* LINNAEUS 1758. 6-17mm. Tot 1200m, larve in eik, beuk, kastanje, haagbeuk. Algemeen
- *Phymatoderus pusillus* FABRICIUS 1787. 5-10mm. (= *Phymatodes pussillum* FABR., *Ph. abdominale* Bon., *Ph. humerale* Muls.). Larve in eik en kastanje. Centraal en Z. Europa
- *Plagionotus arcuatus* LINNAEUS 1758. 6-20mm. Tot 1000m, loopt in de zon, mei – juli op gevelde eiken. Larven in eik, kastanje en beuk. Verspreiding van Europa tot Klein Azië en Iran en in N. Afrika.
- *Xylotrechus antilope* SCHRÖNHERR 1817 en Zetter 1818. 8-14mm. Imago op eikenstronken en schermbloemen. Juni en juli. Larve in *Quercus* (eik). Verspreiding Europa, Turkije, Armenië, Iran, N. Afrika.
- *Clytus rhamni* GERMAR 1817. 6-10mm. Alpien 1000m, imago in juni en juli op *Achillea* en schermbloemen. Larve in dood droog hout van *Robinia*, kastanje en vijgebomen. Zuiderse soort, Z. Europa, klein Azië tot Iran.

- *Anaglyptus mysticus* LINNAEUS 1758. 6-14mm tot 1300m. Imago in mei – juni op hagedoorn, spirea, valeriaan en vlier. Larven in linde, eik en beuk, Esdoorn en *Sambucus racemosa*. Europa en N. Afrika.
- *Rhagium (Megarhagium) sycophanta* SCHRANCK 1781. 16-25mm. Imago reeds volwassen in de herfst maar komt uit in de lente. Vooral op geveld hout. Larven onder schors van eiken, soms van beuk, berk en kastanje. Niet op coniferen (Picard). Verspreiding in Europa, Siberië, Klein Azië.
- *Rhagium (Megarhagium) mordax* DE GEER 1775. (= *Rhagium inquisitor* PANZ) 13-23mm. Imago op gehakt hout, soms op vlier en hagedoorn. In maart – september. Overwintert in rot hout en onder schors. Larve in eik (Mayer), berk onder de schors (Picard) en esdoorn, ook in oude sparren (Bourgeois). Europa tot W. Siberië.
- *Melanopterus scutellata* FABRICIUS 1789. 14-20mm. (= *Brachyleptura scutellata*, = *Leptura scutellata*). Imago op *Cistus salvifolium*, *Rubus*, *Sambucus*, *Spirea ebulus* en op gevelde beuken in grote bossen. Larven in beuk, kurkeik, eik, hagebeuk, berk en olm. Bij ons bekend van het Zoniënwoud. Verspreiding in Europa tot Turkije, N. Iran en Armenië.
- *Aredolpona fontenayi* MULSANT 1839. 11-19mm. (= *Leptura fontenayi* MULSANT 1839-1863). Imago zeer thermofiel, in zon op boomstammen. Larven in eik (Xambeu), *Quercus pyrenaica*, uit eucalyptus, esdoorn en ceder (Peyerimoff). Z. Europa en N. Afrika.
- *Aredolpona rubra* LINNAEUS 1758. 10-19mm. (= *Leptura rubra* L., = *Brachyleptura rubra* L.) Sexueel dimorfisme ♀ eenvoudig bruin-rood, ♂ zwart pronotum, dekschilden geel, eigen aan naaldbossen, larve in dode sparren en *Epicea*. Algemeen in Europa, Siberië en N. Afrika.
- *Allosterna tabacicolor* DE GEER 1775. 6-9mm. Imago in april-mei op bloemen van meidoorn, braam, spirea, *heracleum* (bereklaauw), *Anthriscus*. Larven in dood hout en onder de schors van olmen, esdoorn en wilg. Algemeen van Europa tot W. Siberië.
- *Pedostrangalia revestita* LINNAEUS 1767. 11-16mm (= *Leptura revestita* L., = *Leptura villica* FABRICIUS 1775). Imago in mei-juni op stam van loofbomen, olm, populier, wilde kastanje, notelaar. Larve in kers. Verspreiding in centraal- en zuid-Europa.
- *Stenurella melanura* LINNAEUS 1758. 6-10mm. (= *Leptura melanura* LINNAEUS, = *Stenurella melanura*). Tot 1500m. Imago aan bosrand op bloem van braam en schermbloemen. Larve in eik. Algemeen Euro-siberisch.
- *Agapanthia cardui* LINNAEUS 1767. (= *A. suturalis* FABRICIUS). Imago op *Leucanthemum vulgare* en distels. Larve in de stengel van Cardiceen maar ook in *Asphodela*, *Dipsacus silvestris*, *Melilotus*, *Pyrethrum parthenium* (composiet), valeriaan. W. Europa, niet algemeen.
- *Monochamus galloprovincialis* OLIVIER 1759. 15-25mm. Imago op naaldbomen. Larve in stam en takken van gevelde naaldbomen (ontw. duurt 1 jaar). In zee-den, Alep-den, *Pinus laricio* en ruwe den. Kan plaatselijk algemeen zijn. Vliegt s' avonds. W. Europees (niet vermeld in Oost-Europese fauna).

- *Exocentrus adpersus* Mulsant 1846. 5-8mm. Imago op eik, juni-augustus. Larven in eik, els, kastanje, berk. Meridionaal Europa.
- *Aegomorphus varius* FABRICIUS 1787. (= *Acanthoderus varius* FABR. 1787, = *Ac. clavipes* SCHRANK, = *Psapharochrus varius* THOMS. 1864). 14-16mm. Op dode stronken, juni-augustus. De polyfage larve graaft gangen onder de schors van berk, beuk, eik, linde, esdoor, notelaar, wilg, moerbeï, populier, kerselaar, pruimelaar en graaft zich wat dieper in om te verpoppen. W. Europese alpiene en meridionale soort.
- *Pogonocherus hispidulus* PILLER & MITTERPACHER 1783. 6-7mm. Imago verschijnt in september en overwintert onder de schors en verschijnt opnieuw in de lente. Larve in dood hout van loofbomen, appel, hazelnoot, eik, olm, volgens Olivier ook in dennenbossen. W. mediterraan, Atlantisch.
- *Anaesthetis testacaea* FABRICIUS 1781. 6-10mm. Larve in kastanje, notelaar en eik, ook soms in wilg, hazelnoot, berk. De larven zitten in dunne droge takken en twijgen. Imago mei-augustus. Komt op licht af. West- en centraal- Europa
- *Saperda carcharias* LINNAEUS 1758. Zeer grote aantallen in Santander y Santa Cruz tussen 10 augustus en 16 oktober gedurende de jaren 1995, 1997, 1998, 1999 en 2000. Komt soms op kunstlicht af. Op zwarte populier, slechts uitzonderlijk op canadapopulier, soms echter ook in wilg.