

De taxonomie der mieren.

E. Wilson beschrijft in zijn boek *Naturalist* Warner Books 1995 hoe hij één van de zeldzaamste mieren ter wereld terugvond namelijk *Aneuretus simoni* waarvan men dacht dat ze uitgestorven was. De *Aneuretini* zijn in de evolutie de taxon waaruit zowel de *Myrmicinae* als de *Dolichoderinae* zijn ontstaan. Het zijn de twee taxa van de *Formicidae* die nu over de ganse wereld verspreid zijn. 50 miljoen jaren geleden waren echter de *Aneuretinae* verspreid over gans het continent Laurasië (Azië + N. Amerika). Nu blijft van de *Aneuretinae* slechts één soort over, nl. *Anueretus simoni* waarvan de laatst bekende exemplaren gevangen in Peradenya botanic gardens bij Kandy in Sri Lanka (Ceylon). E; Wilson vond ze terug in de resten van het oerwoud op Adams Peak (centraal bergland van Sri Lanka) in 1955 toen bij het toevallig openbreken van een dode tak de kleine gele *Aneuretus* mieren te voorschijn kwamen, een soort die sedert 50 jaren niet meer gezien was, en op deze plaats bleek *Aneuretus* zelfs algemeen te zijn. Maar, 20 jaren later bleek de soort ook daar onvindbaar geworden te zijn en is in het “Red data book” opgenomen.